


# BSV MaisPack's - WIRKUNGSSPEKTRUM

	VA	NA	NA spezial	NAs sanft	NA TBA-frei	NA light
<b>Art.Nr.</b>	340200	340600	340400	340500	340300	340600L
<b>Ungräser</b>	Ackerfuchsschwanz	●	●	●	●	●
	Weidelgras	◐	●	●	●	●
	Windhalm	●	●	●	●	●
	Ausfallgetreide	◐	●	●	●	●
	Flughafer	◐	●	●	○	◐
	Jährige Rispe	●	●	●	◐	●
	Quecke	◐	●	●	◐	◐
	Hühnerhirse	◐	●	●	●	●
	Borstenhirse	◐	●	●	◐	●
	Fingerhirse	◐	◐	◐	◐	◐
<b>Unkräuter</b>	Ackerhellerkraut	●	●	●	●	●
	Ackerstiefmütterchen	●	●	●	●	◐
	Ackervergissmeinnicht	●	●	●	●	◐
	Ackerschachtelhalm	◐	◐	◐	◐	◐
	Ausfallrapspfl.	●	●	●	●	●
	Amarant	◐	●	●	◐	●
	Ampferbl. Knöterich	◐	◐	◐	●	◐
	Windknöterich	◐	◐	◐	◐	◐
	Franzosenkraut	●	●	●	●	●
	Gänsefuß-Arten	●	●	●	●	●
	Spreizende Melde	◐	●	●	●	●
	Gemeine Melde	◐	●	●	●	●
	Kamille	●	●	●	●	●
	Klettenlabkraut	●	●	●	●	●
	Kreuzkraut	●	●	●	●	●
	Schw. Nachtschatten	◐	●	●	●	◐
	Storchschnabel	◐	◐	◐	◐	◐
	Ehrenpreis	●	●	●	●	●
	Hirtentäschelkraut	●	●	●	●	●
	Taubnessel-Arten	●	●	●	●	●
	Vogel-Sternmiere	●	●	●	●	●
	Knöterich-Arten	◐	●	●	◐	◐

Wirkung: ○ = keine ◐ = gering ◑ = mittel ◒ = gut ● = sehr gut

# Maisherbizide 2020



BSV Saaten • 85737 Ismaning

## BSV MaisPACK's - WIRKSTOFFE

	VA	NA	NA spezial	NAs sanft	NA TBA-frei	NA light
Art. Nr.	340200	340600	340400	340500	340300	340600L
TBA - frei	-	-	-	-	ja	-
Gräserwirkung	-	ja	ja	-	ja	ja
Wirkstoffe	Terbutylazin (520,5 g/l)	Foramsulfuron (31,5 g/l)	Foramsulfuron (31,5 g/l)	Sulcotrion (300 g/l)	Dicamba (609 g/l)	Dicamba (609 g/l)
	Pethoxamid (300 g/l)	Iodosulfuron (1 g/l)	Iodosulfuron (1 g/l)	Flufenacet (200 g/l)	Rimsulfuron (32,5 g/l)	Rimsulfuron (32,5 g/l)
	Flufenacet (200 g/l)	Thien-carbazin-M. (10 g/l)	Thien-carbazin-M. (10 g/l)	Terbutylazin (333 g/l)	FHS	FHS (300 g/l)
		Terbutylazin (187,5 g/l)	Terbutylazin (250 g/l)		Dimethenamid-P (720 g/l)	Flufenacet (200 g/l)
	Pethoxamid (300 g/l)	Dimethenamid-P (280 g/l)			Terbutylazin (333 g/l)	
Anwendung	Vorauf- lauf	Nachauf- lauf	Nachauf- lauf	Nachauf- lauf	Nachauf- lauf	Nachauf- lauf
Wirkung	Blatt : Boden	Blatt : Boden	Blatt : Boden	Blatt : Boden	Blatt : Boden	Blatt : Boden
	10 : 90	50 : 50	50 : 50	50 : 50	60 : 40	60 : 40

## HINWEISE

- Auskunft über Abstandsauflagen erhalten Sie bei Ihrem Verkaufsberater oder telefonisch unter der 0 89 / 96 24 35 - 35.
- Achten Sie auf eine ausreichende Wachsschicht der Maispflanzen, daher nicht direkt nach Niederschlägen behandeln.
- Hohe Differenzen zwischen Tag- und Nachttemperaturen vermindern die Wirksamkeit der Herbizide.

## BSV MaisPACK's - MAISUNTERSAATEN

Bei Fragen zu Maisuntersaaten hilft Ihnen gerne:

**Mike Schaber**, Produktmanager Pflanzenschutz

Tel.: +49 (0) 89 / 96 24 35 35, E-Mail: schaber@bsv-saaten.com

## BSV MaisPACK's - AUFWAND & REICHWEITE

	VA	NA	NA spezial	NAs sanft	NA TBA-frei	NA light
Gebinde	12,5 + 5	5 + 12,5	5 + 10	5 + 5	1,2 + 1 + 5	1,2 + 1 + 5
Aufwand (Itr./ha)	2,5 + 1	1 + 2,5	1 + 2	1 + 1	0,22 + 0,2 + 1	0,22 + 0,2 + 1
Ø Reichweite in ha	5	5	5	5	5	5

## GEGEN PROBLEMKRÄUTER

### Kartoffeldurchwuchs


- BSV MaisPack **NAs sanft**

### Ampfer, Ackerkratzdistel, Brennessel, Winden

- BSV MaisPack **NA TBA-frei** oder BSV MaisPack **NA light**

**Wichtig:** Bei Behandlung müssen die Problemunkräuter bereits aufgelaufen sein.

## BSV-MaisPACK's - BEHANDLUNGSZEITPUNKTE



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie entsprechen aktuellen Erfahrungen und Beobachtungen im Anbau. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann trotz größter Sorgfalt nicht übernommen werden, da die Wachstumsbedingungen umweltbedingt erheblichen Schwankungen unterliegen.